



Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

Osztályvezető főorvos: **Dr. Szalay Miklós**

5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 9-11. Telefon: (06) 56 550 417

A SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁST KIEGÉSZÍTŐ BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Tájékoztató és beleegyző nyilatkozat a szülésvezetés módjáról, előzetes császármetszésen átesett szülőknők számára

Ismerem a tényt, hogy rajtam korábban császármetszést végeztek.

Megértettem és tudomásul veszem, hogy

1. előzetes császármetszés utáni hüvelyi szülés alacsonyabb kockázatokkal jár, mint ha ismételt császármetszést végeznek rajtam.
2. lehetőségem van ismételt császármetszés végzését kérni, vagy választani a hüvelyi szülést előzetes császármetszés után.
3. az előzetes császármetszés után hüvelyi szülést választó nők körülbelül 70%-a képes sikeresen hüvelyi úton szülni.
4. a szülés valamennyi módja kismértékű kockázatot jelent az anya és a magzat számára egyaránt.
5. az előzetes császármetszés utáni hüvelyi szülés során körülbelül 1% annak a kockázata, hogy a méh azon részén, ahol a korábbi műtét történt méhrepedés lép fel.
6. amennyiben az előzetes császármetszés utáni hüvelyi szülés során méhrepedés következik be, az ilyenkor elvégzendő sürgős császármetszéssel sem minden esetben előzhető meg a súlyos anyai vagy magzati károsodás.
7. a döntést, mely szerint megkísérlem az előzetes császármetszés utáni hüvelyi szülést, teljes mértékben nekem kell meghoznom. Tudom, hogy van, lehetőségem ismételt császármetszés végzését kérni, ezt a lehetőséget ismertették velem.
8. sikeres hüvelyi szülés esetén a szülés után kevesebb problémám lesz, és rövidebb ideig kell kórházban tartózkodnom, mint császármetszés után.
9. előzetes császármetszés utáni hüvelyi szülés során a méh izomzatának összehúzódását segíti Oxytocin hormon adása válhat szükségessé a szülés segítése céljából, és ennek a hormonnak az adása szövődményekkel járhat, melyet előttem részletesen ismertettek.
10. amennyiben hüvelyi szülést választok, és a szülést mégis császármetszéssel kell befejezni, a lehetséges szövődmények esélye valamivel nagyobb, mint ha eleve ismételt (tervezett) császármetszést végeznének rajtam.
11. előzetes császármetszés utáni hüvelyi szülés esetén gyakrabban van szükség úgynevezett hüvelyi szülésbefejező műtét (vacuumextractio,) végzésére.
12. ha tervezetten ismételt császármetszést végeznek, azt a betöltött 39. héten végzik el, a magzat méhen belüli elhalásának 39. hét utáni kissé fokozottabb veszélye miatt.
13. döntésemet a terhességem folyamán bármikor megváltoztathatom.

Kijelentem, hogy elolvastam és megértettem a fenti tájékoztatást. Kezelőorvosommal,

dr.-al történt megbeszélést követően lehetőségem volt kérdéseket feltenni,
és a kérdéseimre megfelelő válaszokat kaptam.

A tájékoztatást kielégítőnek tartom, további kérdéseim nincsenek.

Mezőtúr, 20..... év hónap nap.

Kérjük, a megfelelő helyen írja alá:

A hüvelyi úton történő szülést választom:

.....
a szülőnő vagy törvényes képviselő aláírása
neve:.....

TAJ-száma:.....

Ismételt császármetszés végzését kérem:

.....
a szülőnő vagy törvényes képviselő aláírása
neve:.....

TAJ-száma:.....